

PAKKAUSSELOSTE

Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

- Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin puoleen.
- Tämä lääke on määrätty Sinulle henkilökohtaisesti eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin Sinun.

Tässä selosteessa esitetään:

1. Mitä PERSANTIN on ja mihin sitä käytetään
2. Ennen kuin otat PERSANTIN tabletteja
3. Miten PERSANTIN tabletteja otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. PERSANTIN tablettien säilyttäminen
6. Muuta tietoa

PERSANTIN 75 mg ja 100 mg tabletti, päällystetty Dipyridamoli

- Vaikuttava aine on dipyridamoli 75 mg tai 100 mg tablettia kohti
- PERSANTIN 75 mg tablettien muut aineet ovat vedetön kalsiumvetyfosfaatti, maissitärkkelys, liukeneva maissitärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, sakkaroosi 28 mg, talkki, akaasiakumi, makrogoli 6000, valkovaha, karnaubavaha ja väriaineet titaanidioksidi (E 171), punainen rautaoksidi (E 172)
- PERSANTIN 100 mg tablettien muut aineet ovat vedetön kalsiumvetyfosfaatti, maissitärkkelys, liukeneva maissitärkkelys, vedetön kolloidinen piidioksidi, magnesiumstearaatti, sakkaroosi 49 mg, talkki, akaasiakumi, makrogoli 6000, valkovaha, karnaubavaha ja väriaine titaanidioksidi (E 171)

Myyntiluvan haltija

Boehringer Ingelheim International GmbH
D-55216 Ingelheim am Rhein, Saksa

Valmistaja

Delpharm Reims
10 rue Colonel Charbonneaux
51100 Reims, Ranska

1. MITÄ PERSANTIN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PERSANTIN tabletit vähentävät verihutaleiden (trombosyyttien) taipumusta muodostaa veritulppia. PERSANTIN tableteilla on myös verisuonia laajentavia ominaisuuksia. Valmisteita käytetään yhdessä verenohennuslääkkeiden kanssa sellaisten verisuonileikkausten jälkeen, joihin liittyy veritulpan muodostumisen vaara.

2. ENNEN KUIN OTAT PERSANTIN TABLETTEJA

Älä ota PERSANTIN tabletteja

- jos olet yliherkkä (allerginen) dipyridamolille tai PERSANTIN tablettien jollekin muulle aineelle.

Ole erityisen varovainen PERSANTIN tablettien suhteen:

- jos sinulla on vaikea sepelvaltimotauti (esim. epästabili angina pectoris tai äskettäin sairastettu sydäninfarkti)

Jos sinulla on lihasheikkoussairaus (myasthenia gravis), kerro siitä lääkärillesi ennen PERSANTIN hoidon aloitusta.

Raskaus

PERSANTIN valmisteiden käytöstä raskauden aikana ei ole kokemusta. Tämän vuoksi lääkärin kanssa tulee neuvotella ennen valmisteiden käyttöä raskauden aikana.

Imettäminen

Dipyridamoli erittyy äidinmaitoon, mutta sillä ei todennäköisesti ole vaikutusta lapseen. Neuvottele kuitenkin lääkärin kanssa ennen valmisteiden käyttöä imetyksen aikana.

Muiden lääkkeiden käyttö

Ilmoita lääkärillesi tai apteekkiin, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt.

PERSANTIN valmisteet saattavat voimistaa verenpainetta alentavien lääkkeiden vaikutusta.

3. MITEN PERSANTIN TABLETTEJA OTETAAN

Ota PERSANTIN tabletteja juuri sen verran kuin lääkärisi on määrännyt. Tarkista lääkäriltäsi tai apteekistasi, mikäli olet epävarma.

Tavanomainen annos aikuisille on 75 mg – 150 mg 3 kertaa vuorokaudessa. Tabletit otetaan runsaan nestemäärän kera mielellään ennen ateriaa.

Jos Sinusta tuntuu, että PERSANTIN tablettien vaikutus on liian voimakas tai liian heikko, kerro asiasta lääkärillesi tai apteekkiin.

Jos otat enemmän PERSANTIN tabletteja kuin Sinun pitäisi:

Mikäli olet ottanut liian suuren määrän lääkettä, ota yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen.

Yliannostuksen oireina saattaa esiintyä lämmöntunnetta, punastumista, hikoilua, sydämentykytystä, rauhattomuutta, heikotusta, huimausta, verenpaineen laskua ja rintakipuja.

Jos unohdat ottaa PERSANTIN tabletteja

Älä ota kaksinkertaista annosta korvatakseksi unohtamasi kerta-annoksen.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET

Kuten kaikilla lääkkeillä, PERSANTIN tableteilla voi olla haittavaikutuksia.

Haittavaikutukset ovat tavallisesti lieviä ja ohimeneviä.

Yleiset: päänsärky, huimaus, ripuli, pahoinvointi

Melko harvinaiset: verihiutaleiden väheneminen, sydämentykytys, sepelvaltimotaudin paheneminen, verenpaineen lasku, lämmöntunne, oksentelu, lihaskivut

Harvinaiset: verenvuodon lisääntyminen leikkauksen yhteydessä, yliherkkyysreaktiot kuten ihottuma, nokkosihottuma, keuhkoputkien supistuminen ja kasvojen ja kaula-alueen kudosturvotus

Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa, kerro niistä lääkärillesi tai apteekkiin.

5. PERSANTIN TABLETTIEN SÄILYTTÄMINEN**Ei lasten ulottuville.**

PERSANTIN tabletit säilytetään huoneenlämmössä (15 – 25 °C).

Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty pakkaukseen.

Käyttämättä jäänyt tai vanhentunut lääke voidaan palauttaa apteekkiin hävitettäväksi.

6. MUUTA TIETOA

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Boehringer Ingelheim Finland Ky
Tammasaarenkatu 5
00180 Helsinki
p. 010 3102 800

Tämä seloste on tarkistettu viimeksi 10.12.2008

BIPACKSEDEL

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.
- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad PERSANTIN är och vad det används för
2. Innan du tar PERSANTIN
3. Hur du tar PERSANTIN
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av PERSANTIN
6. Övriga upplysningar

PERSANTIN 75 mg och 100 mg tablett, dragerad Dipyridamol

- Det aktiva innehållsämnet är dipyridamol 75 mg eller 100 mg per tablett
- Övriga innehållsämnen i PERSANTIN 75 mg tablett är vattenfri kalciumvätefosfat, majsstärkelse, löslig majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, sackaros 28 mg, talk, akaciagummi, makrogol 6000, vitt vax, karnaubavax samt färgämne titandioxid (E 171) och röd järnoxid (E 172)
- Övriga innehållsämnen i PERSANTIN 100 mg tablett är vattenfri kalciumvätefosfat, majsstärkelse, löslig majsstärkelse, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat, sackaros 49 mg, talk, akaciagummi, makrogol 6000, vitt vax, karnaubavax samt färgämne titandioxid (E 171)

Innehavare av godkännande för försäljning

Boehringer Ingelheim International GmbH
D-55216 Ingelheim am Rhein, Tyskland

Tillverkare

Delpharm Reims
10 rue Colonel Charbonneaux
51100 Reims, Frankrike

1. VAD PERSANTIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

PERSANTIN minskar blodplättarnas (trombocyternas) benägenhet att bilda blodproppar. PERSANTIN har även en kärlvidgande effekt.

PERSANTIN används i kombination med antikoagulantia vid kärlkirurgiska tillstånd med ökad risk att få blodpropp.

2. INNAN DU TAR PERSANTIN

Ta inte PERSANTIN:

- om du är överkänslig (allergisk) mot dipyridamol eller något av övriga innehållsämnen i PERSANTIN

Var särskilt försiktig med PERSANTIN:

- om du har en svår koronarartärsjukdom (t.ex. instabil angina pectoris eller nyligen genomgången hjärtinfarkt)

Om du har muskelsvaghet (myasthenia gravis), rådgör med läkaren innan behandling med PERSANTIN påbörjas.

Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare vid bruk av PERSANTIN under graviditet.

Amning

Dipyridamol går över i modersmjölk, men påverkan på det diande barnet är osannoligt. Rådgör dock med läkare vid bruk av PERSANTIN under amning.

Intag av andra läkemedel:

Tala om för din läkare eller farmaceut om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

PERSANTIN kan förstärka effekten av blodtryckssänkande medel.

3. HUR DU TAR PERSANTIN

Ta alltid PERSANTIN enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller farmaceut om du är osäker.

Vanlig dos för vuxna är 75 mg – 150 mg 3 gånger dagligen.

Tabletter skall intas med vätska, helst före måltid.

Om du upplever att effekten av PERSANTIN är för stark eller för svag vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Om du tar mera PERSANTIN än vad du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen.

Vid överdosering kan följande symptom uppträda: värmekänsla, rödnad, svettningar, hjärtklappning, oro, svaghet, yrsel, blodtrycksfall, bröstsmärtor.

Om du har glömt att ta PERSANTIN:

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan PERSANTIN ha biverkningar. Biverkningarna är vanligen milda och övergående.

Vanliga: huvudvärk, yrsel, diarré, illamående

Mindre vanliga: minskning av blodplättar, hjärtklappning, försämring av koronarartärsjukdom, lågt blodtryck, värmekänsla, kräkning, muskelsmärta

Sällsynta: ökad blödning i samband med operation, överkänslighetsreaktioner såsom hudutslag, urtikaria, sammandragningar i luftrören och svullnad av ansikts- och halsområdet

Om du observerar en eller flera biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller farmaceut.

5. FÖRVARING AV PERSANTIN**Förvaras oåtkomligt för barn.**

PERSANTIN förvaras i rumstemperatur (15 – 25 °C).

Används före det utgångsdatum som finns angivet på förpackningen.

Överbliven och för gammal medicin skall lämnas till apoteket för förstöring.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Boehringer Ingelheim Finland Ky
Märaholmsgatan 5
00180 Helsingfors
Tel. 010 310 2800

Denna bipacksedeln har reviderats senast 10.12.2008